

COKCIMAX 10

(maduramicin)

premiks za mediciniranu hranu

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

Maduramicin-amonijum 10 mg

INDIKACIJE:

Lek je namenjen za preveniranje kokcidioze prouzrokovane kokcidijama iz roda Eimeria (E. tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis i E. necatrix) kod brojlera, kao i za preveniranje kokcidioze prouzrokovane E. adenoides, E. Meleagridis, E. dispersa i E. gallopavonis, kod čurića u tovu.

KONTRAINDIKACIJE:

Lek se ne daje komercijalnim nosiljama. Lek ne davati drugim vrstama životinja. Ne daje se istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe tiamulina. Ne daje se istovremeno sa drugim kokcidiostaticima.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Samo ukoliko se primene koncentracije više od terapijskih, ili ako se lek ne umeša ravnomerno u hranu, kod živine može doći do pojave inapetence.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Brojleri i čurići.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Lek se primenjuje u količini koja za indikovane kategorije pilića i čurića iznosi 0,5 kg leka na 1 tonu hrane, što je jednako koncentraciji od 5 ppm maduramicin-amonijuma. Brojlerima i tovним čurićima medicinirana hrana se daje od prvog dana života do 5 dana pred završetak tova.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba ravnomerno umešati sa hranom, tako što se određena količina leka prvo pomeša sa jednom desetinom odgovarajuće količine hrane, a zatim se ovoj smeši postepeno dodaje preostala količina hrane.

Za primenu na životinjama!

KARENCA:

Meso tretirane živine (pilića i čurića) nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 5 dana od poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati na temperaturi do 25oC, zaštićeno od vlage. Čuvati van domaćaja dece. Rok upotrebe 1 godina.

PAKOVANJE: a 20 kg

ATCvet kod: QP51AX10

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVODAČ: FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica