



**premix za mediciniranu hranu**  
(za primenu na životinjama)

**Cokcimax 10,**  
(maduramicin)

**SASTAV:**

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:  
Aktivna supstanca: Maduramicin - amonijum 10 mg  
Ekscipijens: Kukuruzni skrob do 1g

**NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA:**  
FISH CORP. 2000 d.o.o., Tuk Ugarnice 68, Subotica

**NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET:**  
FISH CORP. 2000 d.o.o., Vojvode Stepe br. 78, Beograd

**CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:**  
Brojleri i čurčići.

**INDIKACIJE:**

Lek je namenjen za preveniranje kokcidioze prouzrokovane kokcijama iz *Eimeria* (*E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis* i *E. necatrix*.) kod brojlera, kao i za preveniranje kokcidioze prouzrokovane *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. dispersa* i *E. gallopavonis*, kod čurčića u tovu.

**DOZIRANJE:**

Lek se primenjuje u količini koja za indikovane kategorije pilića i čurčića iznosi 0,5 kg leka na 1 l hrane, što je jednako koncentraciji od 5 ppm maduramicin-amonijuma. Brojlerima i tovnim čurčićima medicinirana hrana se daje od prvog dana života do 5 dana pred završetak tova.

**NAČIN PRIMENE:**

Upotreba dodavanjem u hranu.

**UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:**

Lek treba ravnomerno umešati sa hranom, tako što se određena količina leka prvo pomeša sa jednom desetnom odgovarajuće količine hrane, a zatim se ovoj smeši postepeno dodaje preostala količina hrane.

**KONTRAINDIKACIJE:**

Lek se ne daje komercijalnim nosiljama. Lek ne davati drugim vrstama životinja! Ne daje se istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe tiamulina. Ne daje se istovremeno sa drugim kokcidistaticima.

**NEŽELJENA DEJSTVA:**

Samo ukoliko se primene koncentracije više od terapijskih, ili ako se lek ne umeša ravnomerno u hranu, kod živine može doći do pojave inapetance.

**KARENCA:**

Meso tretirane živine (pilića i čurčića) nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 5 dana posle poslednje primene leka.

**POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:**

Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od vlage. Čuvati van domašaja dece.

**POSEBNA UPOZORENJA:**

Za primenu na životinjama.

**Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:**

Priilikom mešanja leka sa hranom i primene medicinirane hrane treba zaštititi kožu, oči i sluzokožu, odnosno koristiti zaštitne rukavice, zaštitno odelo i obuću.

Posle pripremanja i primene medicinirane hrane, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti.

Ukoliko dođe do kontakta leka sa očima, odmah ih isprati većom količinom vode.

Ukoliko dođe do kontakta leka sa nezaštićenom kožom, odmah je oprati vodom i sapunom.

**POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA I LI OSTATKA LEKA:**

Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

**DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA:**

07. 2006.

**BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET:**

61/2006/1400 od 17.07.2006.

**BROJ SERIJE:**



**DATUM PROIZVODJE:**



**ROK UPOTREBE :** 1 godina

Hranu u koju je umešan lek treba utrošiti odmah nakon mešanja sa lekom.

**PAKOVANJE:**

Višeslojna papirna kesica sa 20 kg premiksa.

**ATC vet QP51AX10**

**IZDAJE SE NA RECEPT.**

**LEK SE NE MOŽE UPOTREBITI NAKON ISTEKA ROKA UPOTREBE**



806008401236



Proizvodnja vitaminsko-mineralnih premiksa

**COKCIMAX FEED**