

MAGNUM 44 LS

(linkomicin, spektinomicin)
premiksa za mediciniranu hranu



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivne supstance:

linkomicin hidrohlorid 22 mg

spektinomicin hidrohlorid 22 mg

INDIKACIJE:

Za kontrolu i lečenje dizenterije svinja primarno uzrokovane sa *Serpulina hyodysenteriae* zajedno sa *Fusobacterium*, *Clostridium* i/ili *Campylobacter* spp. koji su osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina. Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja koju izazivaju *Escherichia coli* i *Salmonella* spp. osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja koju izaziva *Lawsonia intracellularis* (pleitis). Kao pomoćni terapeutik u suzbijanju mikoplazmatske pneumonije kod svinja. U lečenju MMA sindroma kada je uzročnik osetljiv na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

KONTRAINDIKACIJE:

Primena leka MAGNUM 44 LS je kontraindikovana kod preživara, konja, kunića, zamoraca, hrčkova. Lek se ne koristi kod koka nosilja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji izraženi kao mučnina, povraćanje, abdominalni grčevi, proliv i pseudomembranozni kolitis. Retko se javljaju reakcije preosetljivosti izražene kao crvenilo i iritacija kože koji nestaju nekoliko dana posle prestanka primene leka.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

U lečenju i kontroli enteritisa:

Lečenje: 2 kg preparata po toni hrane u toku 3 nedelje ili dok ne prestanu klinički znaci bolesti.

Kontrola: 1-2 kg preparata po toni hrane u rizičnom periodu. Lečenje MMA: 1-2 kg preparata po toni hrane u toku 5-10 dana pre i 2-3 nedelje posle prašenja.

U kontroli mikoplazmatske pneumonije: 1-2 kg preparata po toni hrane primenjivati svakodnevno u rizičnom periodu.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Napravljenu mediciniranu hranu treba utrošiti u toku dana. Za primenu na životinjama!

KARENCA:

Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 2 dana nakon poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati van domašaja dece !

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, tamnom i hladnom mestu. Rok upotrebe 2 godine.

PAKOVANJE: a 1 kg, a 10 kg

ATCvet kod: QJ01RA94

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ:

FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica