

MAXAMOX 200

(amoksicilin)
oralni prašak



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

Amoksicilin trihidrat 200 mg

INDIKACIJE:

MAXAMOX 200 oralni prašak je antibiotik širokog spektra koji je indikovan u lečenju bakterijskih infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta, kao i infekcija kože i mekih tkiva kod teladi (do početka preživanja), svinja, brojlera i čurića.

KONTRAINDIKACIJE:

Preparat MAXAMOX 200 se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara, konja i malih herbivora (zečeva, zamoraca, hrčkova). Takođe, lek se ne primenjuje kod koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku ishranu.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Kod tretiranih životinja moguća je pojava dijareje kao i pojava reakcija preosetljivosti. U tom slučaju terapiju treba odmah prekinuti. U slučaju pojave ozbiljnih reakcija preosetljivosti, odmah potražiti pomoć veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i čurići

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

MAXAMOX 200 se primenjuje oralno, pomešan u vodi za piće ili umešan u hranu, u sledećim dozama:

Brojleri i čurići: dnevnu dozu od 40-80 g leka treba rastvoriti u 80 litara vode za piće dnevno što je dovoljno za 100 jedinki prosečne telesne mase od 1 kg.

Svinje i telad: 2-4 g leka na 100 kg telesne mase treba dati dva puta dnevno rastvoren u vodi za piće, odnosno 1-2 kg leka na tonu hrane.

Terapija traje 4 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode/hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini vode/hrane.

Rastvor leka u vodi za piće mora se upotrebiti u toku dana. Svakodnevno pripremati svež lekoviti rastvor. Životnjama treba onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Za postizanje bistrog rastvora leka potrebno je 20 g leka rastvoriti u najmanje 7 litara vode. Za primenu na životnjama!

KARENCA:

Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 7 dana od poslednje primene leka kod svinja i teladi, 2 dana od poslednje primene kod brojlera i 5 dana kod čurića.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati van domaćaja dece !

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe 2 godine.

PAKOVANJE:

a 20 g / a 100 g / a 1 kg / a 10 kg

ATCvet kod:

QJ01CA04

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ:

FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica