

SULFAMAX 300

(sulfadiazin, trimetoprim)
oralni prašak



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

sulfadiazin (u obliku sulfadiazin-natrijuma) 250 mg

trimetoprim 50 mg

INDIKACIJE:

SULFAMAX 300 je indikovano u lečenju primarnih infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta i sekundarnih infekcija u toku virusnih bolesti kod živine, svinja i teladi.

-**živina:** lečenje kolintoksikacija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, zarazne korice, kokcidioza i dr.

-**svinje:** lečenje kolibaciloza, atrofičkog rinitisa, salmoneloza, hemofilusinfekcija, pastereloza i dr.

-**telad:** lečenje koliseptikemija, streptokoknog poliartritisa, salmoneloza, pastereloza, pneumonije, stafilokoknih abscesa i dr.

KONTRAINDIKACIJE:

Preparat SULFAMAX 300 nije pogodan za lečenje preživara kod kojih je rumen počeo da funkcioniše. SULFAMAX 300 ne treba davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao ni jedinkama preosetljivim na sulfonamide. SULFAMAX 300 se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Samo ponekad kod tretiranih životinja može doći do pojave nauzeje, povraćanja, dijareje i reakcija preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Živina (kokoške, brojleri, ćurke), svinje, telad

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Lek se daje peroralno pomešan sa hranom ili u vodi za piće, u dnevnoj dozi koja za sve vrste životinja iznosi 1 kg na 1 t hrane, odnosno 1 g na 10 kg telesne mase u vodi za piće dnevno. Terapija traje 5 do 7 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane/vode, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane/vode.

Napravljeni rastvor leka i mediciniranu hranu treba utrošiti u toku dana. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.

Za primenu na životinjama!

KARENCA:

Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 5 dana od poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati van domašaja dece! Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe 3 godine.

PAKOVANJE:

a 20 g, a 100 g, a 1 kg, a 10 kg

ATCvet kod:

QJ01EW10

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ:

FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica