

TIACOR CTC PLUS

(tiamulin, hlortetraciklin)

premiks za mediciniranu hranu



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

Aktivna supstanca:

Tiamulin hidrogenfumarat Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 33,3 mg

Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg

INDIKACIJE:

Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su: infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (*Mycoplasma pneumoniae*), i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (*Ac-tinobacillus pleuro pneumoniae*), atrofični rinitis (*Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*) i sekundarne bakterijske pneumonije.

- infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (*Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae* sa *Campylobacter (Vibrio) coli*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides spp.*, *Clostridium perfringens*), kolabaciloza, nekrotični enteritis (*Clostridium perfringens* tip C) udružen sa *Salmonella cholerae suis*, sekundar- ne bakterijske infekcije posle transmisije ionog gastroenteritisa (TGE), proliferativna enteropatija.

- infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA, sindrom krmača.

KONTRAINDIKACIJE:

Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti. Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja monenzinom, naranzinom ili salinomicinom. Ne daje se krmačama u toku ranog graviditeta-prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnim nerastovima. Ne daje jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Kod svinja se veoma retko mogu javiti prolazni eritem, pruritis i drugi znaci preosetljivosti. Moguća je pojave dijareje i povraćanja. Kod mlađih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

Lek se daje umešan u hrani za:

Prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg premiksa (odgovara 66.6 g tiamulin fumarata i 200 g hlortetraçiklina) na tonu hrane odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.^[1] Prasad preko 8 nedelja starosti: 3 kg premiksa (odgovara 99.9 g tiamulin fumarata i 300 g hlortetraçiklina) na tonu hrane odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.

Kod teških infekcija koje traju duže prasadima do 8 nedelja davati i 3 kg, a starijim i 4.5 kg premiksa na tonu hrane odnosno 300 g ili 450 g na 100 kg hrane.

Terapija traje 7 do 10 dana

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode/hrane, a zatim sa os-tatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini vode/hrane. Rastvor leka u vodi za piće mora se upotrebiti u toku dana. Svakodnevno pripremati svež lekoviti rastvor. Životinjama treba onemogućiti pristup dru-gim izvorima vode. Za postizanje bistrog rastvora leka potrebno je 20 g leka rastvoriti u najmanje 7 litara vode. Za primenu na životinjama!

KARENCA:

Meso svinja ne koristi se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 10 dana od poslednje primene leka.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Čuvati van domaćaja dece.^[1] Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25oC zaštićeno od vlage i svetlosti.^[1] Rok upotrebe 2 godine.

PAKOVANJE: a 100 g, a 1 kg, a 10 kg^[1]

ATCvet kod: QJ01RA90^[1]

REŽIM IZDAVANJA LEKA: Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ: FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica