

TYLOMAX 500

(tilozin)
oralni prašak



KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:

1 g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

tilozin (u obliku tilozin-tartarata) 500 mg

INDIKACIJE:

TYLOMAX 500 oralni prašak je antibiotik koji se koristi za lečenje sistemskih i lokalnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin, i to: živina: lečenje i kontrola mikoplazmoza (mikoplazmoza, hronična respiratorna bolest, zarazni sinuzitis ćuraka), spirohetoza, nekrotičnog enteritisa i crvenog vetra ćuraka.

svinje: lečenje i kontrola dizenterije, proliferativne enteropatije svinja i enzootske pneumonije

telad: lečenje infekcija respiratornog trakta.

KONTRAINDIKACIJE:

Lek se ne primenjuje na životinjama koje su preosetljive na makrolidne antibiotike.

Lek se ne primenjuje kod kokošaka i ćurki nosilja konzumnih jaja kao ni kod odraslih preživara.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Kod preosetljivih životinja moguće su alergijske reakcije. Kod svinja je moguća pojava otoka i svraba analne regije i delimične promene na rektumu, što se povlači (bez posledica) po prestanku primene leka, i nije razlog za prekidanje terapije.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA:

Živina, svinje, telad (kod kojih nije razvijena funkcija preživljanja)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:

TYLOMAX 500 oralni prašak rastvorljiv u vodi aplikuje se živini, svinjama i teladi na sledeći način:

ŽIVINA:

-u vodi za piće u dozi 1 gram TYLOMAX 500 praška na 1 l, obezbediti da živini

voda sa lekom bude jedini izvor vode za piće, terapija traje 5 dana

-aerosolom u dozi 25-30 mg TYLOMAX 500 praška po 1 kilogramu telesne

mase, potrebna količina leka, obračunata prema ukupnoj masi živine u objektu,

rastvori se u destilovanoj vodi i pomoću aparata (prskalice) rasprši, sa

visine oko 50 cm iznad živine, terapija se sprovodi jedanput dnevno i traje 5

dana.

Primer: za 1000 pilića, prosečne mase 1 kg, potrebno je 25-30 grama TYLOMAX 500 praška, koji

se rastvori u 250 ml destilovane vode i rasprši iznad pilića - rastvor za potapanje jaja se dobija

rastvaranjem 1-3 grama TYLOMAX 500 praška u 1 l vode, u rashlađen rastvor leka (2-8°C) potope

se kokošija ili ćureća priplodna jaja, prethodno zagrejana na 35-37°C, i u rastvoru drže 5-20

minuta

SVINJE:

-u vodi za piće u dozi od 1 g TYLOMAX 500 praška na 2 l, terapija traje 3 do 10 dana, sa davanjem

leka treba nastaviti još jedan dan po prestanku simptoma bolesti, obezbediti da voda sa lekom

svinjama bude jedini izvor vode za piće telad: u mleku ili zameni za mleko u dozi od 2 grama

TYLOMAX 500 praška po teletu, dva puta dnevno, terapija traje 7 do 14 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:

Rastvor leka se priprema na taj način što se ukupna količina TYLOMAX 500 praška, predviđena za jedan tretman, najpre rastvori u manjoj količini mlake vode (oko 30°C), tako što se voda dodaje prašku (ne obratno), uz intenzivno mešanje. Zatim se ovom koncentrovanom rastvoru dodaje i preostali deo vode, dok se ne dobije rastvor željene koncentracije. Svakodnevno treba pripremati svež rastvor leka. Za primenu na životinjama!

KARENCA:

Meso (mišići) i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu za ljudsku upotrebu tokom tretmana, kao i u sledećem periodu nakon poslednjeg davanja leka: svinje 2 dana, živina – kokoške 1 dan, živina – ćurke 5 dana, telad 14 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA:

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe 2 godine.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I PAKOVANJE:

a 20 g, a 100 g, a 1 kg, a 10 kg

ATCvet kod:

QJ01FA90

REŽIM IZDAVANJA LEKA:

Lek se izdaje na recept veterinara.

PROIZVOĐAČ:

FISH CORP.2000 d.o.o., Bački Vinogradi, Subotica